

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP - 3 - 4 - 70 042657

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88-30-34

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Poste 571

Régisseur de recettes de la D.D. A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN n° 114 de MARS 1970 - MAINE-et-LOIRE - LOIRE-ATLANTIQUE -
VENDEE P 10

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Dans les vergers des départements du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, la végétation des variétés à débourrement précoce (Passe-cras-sane) s'accroît rapidement. D'autre part, les variétés à débourrement plus tardif (par exemple William, Beurré Hardy) arrivent au stade sensible C3 - D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux). En conséquence, sur les variétés à débourrement précoce traitées conformément à la note du 19 mars, il y a lieu d'effectuer un nouveau traitement dès réception de cette note. Sur les variétés à débourrement plus tardif et qui n'ont pas encore été protégées, une première application devra être exécutée lorsque le stade sensible C3 - D sera atteint.

Les projections d'ascospores sont encore peu abondantes. La période la plus dangereuse n'est pas encore commencée.

TAVELURE DU POMMIER - Dans les vergers des départements du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, les projections d'ascospores sont commencées mais demeurent faibles. La plupart des variétés (Golden delicious, Reine des Reinettes, etc..) atteignent le stade sensible C3 - D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux). Par conséquent un premier traitement doit être exécuté immédiatement sur toutes les variétés ayant atteint le stade sensible C3 - D. Sur les variétés à débourrement plus tardif, la protection devra être assurée au fur et à mesure que le stade C3 - D sera atteint.

Comme pour la Tavelure du poirier, la période la plus dangereuse n'est pas encore commencée.

IMPORTANT : - Il est rappelé que tout traitement dirigé contre les Tavelures et éliminé par les pluies, doit être renouvelé immédiatement sans attendre un avis de la Station.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Les premiers germes sont déjà formés dans les bourgeons. Sur les variétés sensibles on pourra profiter du traitement dirigé contre la Tavelure pour combattre l'oidium.

CLOQUE et MONILIA DU PECHER - La protection contre ces deux affections peut être renouvelée.

GNOMONIA et MONILIA DU CERISIER - La protection doit également être renouvelée.

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux :

J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles :

R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

TIRAGE du 31 MARS 1970.